



Změňte tempo
v léčbě glaukomu

Vážená paní doktorko,
vážený pane doktore,

společnost AbbVie s.r.o. si Vás dovoluje
pozvat na firemní workshop,
který se koná v rámci XXXII. Výročního sjezdu
České oftalmologické společnosti ČLS JEP
pod názvem

Chirurgická léčba glaukomu s otevřeným úhlem

PROGRAM WORKSHOPU

Kdy a komu - role MIBS v léčbě glaukomu

prim. MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.,
Oční klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity
J.E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Tipy pro implantaci gelového implantátu XEN 45

prim. MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.,
Oční klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity
J.E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Výsledky snížení nitroočního tlaku u gelového implantátu Xen

MUDr. Eva Škrlová,
VFN a 1. LF UK v Praze, oční klinika

Výhody a úskalí gelového implantátu Xen

MUDr. Marek Fichtl,
VFN a 1. LF UK v Praze, oční klinika

Těšíme se na setkání s Vámi!

XEN[™]
GLAUCOMA GEL IMPLANT

Clarion Congress Hotel
Olomouc

Sál Andromeda

pátek 27. září 2024

od 17:00 do 18:00 hod.

abbvie



GLAUCOMA GEL IMPLANT

Zkrácená informace o přípravku

Název ZP: Gelový implantát XEN 45 na glaukom. **Název a adresa výrobce:** Allergan, 2525 Dupont Drive Irvine, California 92612, USA. **Určený účel a indikace:** Snížení nitroočního tlaku u pacientů s primárním glaukomem s otevřeným úhlem, kdy se nezdářila předchozí léčba. Pouze pro použití zdravotnickým pracovníkem – chirurgem.

Popis: Léčebný systém XEN je tvořen gelovým implantátem XEN a injektorem XEN. Systém je sterilní (sterilizován ozářením). Na jedno použití. Gelový implantát XEN se zavádí injektorem XEN (mechanický systém pro aplikaci) přístupem *ab interno* malým řezem v rohovce. Implantát XEN vytváří ve sklěře tunel, který umožní průtok komorové vody z vnitřní komory do subkonjunktiválního prostoru, což vede ke snížení nitroočního tlaku. **Složení:** Gelový implantát XEN: želatina odvozená z prasečí kůže, vytvarovaná do trubičky a prokřížená glutaraldehydem. **Kontraindikace:** Glaukom s uzavřeným úhlem, předchozí implantát/chlopeň na glaukom v cílovém kvadrantu, zjizvení spojivky, předchozí operace spojivek nebo jiné patologické stavy spojivek (např. pterygium) v cílovém kvadrantu, aktivní zánět (např. blefaritida, zánět spojivek, zánět rohovky, uveitida), aktivní neovaskularizace duhovky nebo neovaskularizace duhovky během šesti měsíců od data operace, nitrooční čočka v přední komoře, přítomnost nitroočního silikonového oleje, skelný materiál přítomný v přední komoře, zhoršené episklerální žilní odvodnění (např. Sturge-Weber syndrom nebo nanoftalmus nebo jiný doklad zvýšeného žilního tlaku), známá alergie nebo podezření na alergii nebo citlivost na léky potřebné pro chirurgický zákrok nebo na některou ze složek prostředku (například prasečí výrobky nebo glutaraldehyd), anamnéza dermatologické keloidní formace.

Varování: Při použití může dojít k následujícím: posun gelového implantátu, expozice nebo extruze gelového implantátu, ucpání gelového implantátu, choroidální efuze nebo krvácení, hypotonická makulopatie, komplikace spojené s tvorbou puchýřků, odchlípení cévnatky, perforace spojivky, konjunktivitida, poranění oka, fibróza, vysoký nitrooční tlak, zánět/podráždění, iridokorneální syndrom, iridodialýza/ruptura duhovky, iritida, nedostatečná účinnost, lakrimace, nízký nitrooční tlak, maligní glaukom, bolest oka, abnormální vidění, ztráta vidění nebo endoftalmitida a další známé komplikace nitroočních operací (např. plochá nebo mělká komora, hyféma, edém rohovky, makulární edém, odchlípení sítnice, krvácení do sklivce, uveitida). **Bezpečnostní opatření:** Před implantací zkontrolujte neporušenost a expiraci balení, v opačném případě systém XEN nepoužívejte. Po operaci je nutné u pacienta sledovat nitrooční tlak. Při známce zvýšeného odporu kdykoli během implantace, implantaci zastavte a použijte nový injektor. **Hlášení nežádoucích účinků:** Nežádoucí účinky nebo možné komplikace ohrožující zrak hlase prosím elektronicky na SUKL: www.sukl.cz/hlaseni-nezadouci-prihody-a-podezreni-na-nezadouci-prihodu a také emailem společnosti Allergan an Abbvie company: productsurveillance_eame@abbvie.com. *Kompletní návod k použití s podrobnými informacemi o zdravotnickém prostředku je součástí každého balení, před použitím si prosím tento kompletní návod pečlivě přečtete.*